

ARTWORK DESIGN STANDARD INSERT

AMPICILLIN TRIHYDRATE

Size (L x W) 230 x 100 mm

Material
HVS Paper 60g
Packsizes/Primary
10 strips @ 10 caplets
Primary
Strip
No. Reg : XXXXXXXXXXXXX

Front / Back	
Type Font	
Product Name	Another Font
Myriad Pro, Bold	Arial Regular / Bold
8pt	6pt

	
16 x 4mm (LxH)	TEXT Black
Material Code	
IIN00006	

100

230

Ampicillin trihydrate

Kaplet

PEMERIAN DAN DESKRIPSI :

Kaplet cembung warna putih, panjang 18 mm x lebar 7 mm, penandaan atas logo mersi, penandaan bawah *breakline*.

KOMPOSISI :

Zat Aktif

Tiap kaplet mengandung :
Ampicillin Trihydrate setara dengan Ampicillin.....500 mg

Zat Tambahan

Microcrystalline Cellulose 102, Sodium Lauryl sulfate, Sodium Starch Glycolate, Talk, Magnesium Stearat, Colloidal Silicon Dioxide, Lactose Monohydrate.

KOMPOSISI

Tiap kaplet mengandung :
Ampicillin Trihydrate setara dengan Ampicillin.....500 mg

CARA KERJA

Ampicillin adalah derivat Penisillin semi sintetik yang bersifat bakterisid dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Ampicillin aktif terhadap bakteri gram positif (*Streptococcus faecalis*, *Streptococcus pneumoniae* dan *Streptococcus haemolytic*) dan gram negatif (*Haemophilus influenzae*, *Salmonella*, *Neisseria gonorrhoeae* dan *Proteus mirabilis*). Juga aktif terhadap bakteri aerob gram negatif.

INDIKASI

- Infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram positif dan/atau Gram negatif yang peka terhadap Ampicillin.

- Infeksi saluran pernapasan, Bronchopneumonia, Otitis media.

- Infeksi saluran kemih seperti Pielonefritis akut dan kronik, sistitis.

- Gonore yang tidak terkomplikasi.

- Infeksi alat kelamin wanita, puvris kecil seperti aborsi septis, adnaksitis, endometritis, parametritis, pelviperitonitis, demam puerperal.

- Infeksi saluran pencernaan seperti Shigellosis, Salmonellosis.

POSOLOGI / DOSIS

- Secara umum dapat digunakan dosis pemakaian sebagai berikut :
Dewasa dan anak-anak lebih dari 20 kg : 3-4 kali 250-500 mg per hari.

Anak-anak dibawah 20 kg : 50-100 mg/kg bb/hari, dibagi dalam 4 dosis, tiap 6 jam.

- Dosis tinggi diberikan untuk infeksi yang lebih berat.

- Diminum 1 jam sebelum makan.

KONTRAINDIKASI

- Pada pasien yang hipersensitif terhadap Penicillin dan turunannya.

- Pada infeksi yang disebabkan oleh kuman penghasil enzyme Penicillinase.

EFEK SAMPING

- Reaksi alergi : urtikaria dan ruam kulit lainnya.

- Gastrointestinal : glossitis, stomatitis, mual, muntah dan diare pseudomembran colitis.

- Sistem hematopoietik dan limfolik : anemia, trombositopenia, eosinifilia, leukopenia dan agranulositosis.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Ampicillin sebaiknya diminum dengan air yang cukup, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.

- Kemungkinan timbul superinfeksi yang disebabkan oleh *Candida*, *Enterobacter*, *Pseudomonas* pada pemakaian jangka lama dan dosis tinggi.

- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena keamanan penggunaannya belum diketahui dengan pasti.

- Penggunaan Ampicillin agar segera dihentikan bila terdapat efek samping.

- Pemeriksaan periodik terhadap fungsi hati, ginjal dan darah agar dilakukan pada penggunaan jangka panjang.

INTERAKSI OBAT

- Penggunaan bersama dengan Allopurinol, meningkatkan kemungkinan reaksi hipersensitivitas.

- Penggunaan dengan kontrasepsi oral akan menurunkan efektivitas dari kontrasepsi oral.

- Penggunaan dengan Probenecid dapat meningkatkan memperpanjang kadar Ampicillin dalam darah.

OVERDOSIS

- Pada kasus overdosis, pengobatan agar dihentikan.

- Pada pasien dengan kerusakan ginjal, antibiotik kelas Ampicillin dapat dikurangi dengan cara hemodialisis.

CARA PENYIMPANAN

Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya matahari.

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI

Dus, 10 strip @ 10 kaplet Ampicillin trihydrate 500, No. Reg. : XXXXXXXXXXXXX

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Diproduksi oleh :



PT. Mersifarma TM

Sukabumi - Indonesia

0000-000000-00

9000006



PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
DEPARTEMEN DESIGN & PACKAGING

Date of use: 30/07/2024
(DD-MM-YYYY)

Actual size - Size in mm

STANDARD SECONDARY 2024

DISETUJUI OLEH BPOM: 30/07/2024

ID: EREG100244VR12300030

Ampicillin trihydrate
Kaplet

PEMERIAN DAN DESKRIPSI :

Kaplet cembung warna putih, panjang 18 mm x lebar 7 mm, penandaan atas logo mersi, penandaan bawah *breakline*.

	KOMPOSISI :
--	--------------------

	Zat Aktif	
--	-----------	--

Tiap kaplet mengandung :

Tiap kapslet mengandung :	
Ampicillin Trihydrate setara dengan Ampicillin.....	500 mg

	Zat Tambahan
--	--------------

Microcrystalline Cellulose 102, Sodium Lauryl sulfate, Sodium Starch Glycolate, Talk, Magnesium Stearat, Colloidal Silicon Dioxide, Lactose Monohydrate.

	KOMPOSISI
--	-----------

KOMPOSISI
Tiap kaplet mengandung :

Amoxicillin Trihydrate setara dengan Ampicillin.....500 mg

	CARA KERJA
--	------------

AMPCILLIN
Ampicillin adalah derivate Penisillin semi sintetik yang bersifat bakterisid dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Ampicillin aktif terhadap bakteri gram positif (*Streptococcus faecalis*, *Streptococcus pneumoniae* dan *Streptococcus haemolytic*) dan bakteri negatif (*Haemophilus influenzae*, *Salmonella*, *Neisseria gonorrhoeae* dan *Proteus mirabilis*). Juga aktif terhadap bakteri aerob gram negatif.

	INDIKASI
--	----------

- Infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram positif dan/atau Gram negatif yang peka terhadap Ampicillin.
- Infeksi saluran pernapasan, Bronchipneumonia, Otitis media.
- Infeksi saluran kemih seperti Pielonefritis akut dan kronik, sistitis.
- Gonore yang tidak terkomplikasi.
- Infeksi alat kelamin wanita, pervis kecil seperti absorsi septs, adnaksitis, endometritis, parametritis, pelvipertonitis, demam puerperal.
- Infeksi saluran pencernaan seperti Shigellosis, Salmonellosis.

	POSOLÓGÍ / DOSIS
--	-------------------------

- Secara umum dapat digunakan dosis pemakaian sebagai berikut :
- Dewasa dan anak-anak lebih dari 20 kg : 3-4 kali 250-500 mg per hari.
 - Anak-anak dibawah 20 kg : 50-100 mg/kg bb/hari, dibagi dalam 4 dosis, tiap 6 jam.
 - Dosis tinggi diberikan untuk infeksi yang lebih berat.
 - Diminum 1 jam sebelum makan.

10	KONTRAINDIKASI
----	----------------

- Pada pasien yang hipersensitif terhadap Penicillin dan turunannya.
- Pada infeksi yang disebabkan oleh kuman penghasil enzim Penicillinase.

	FFEK SAMPLING
--	---------------

- Reaksi alergi : urtikaria dan ruam kulit lainnya.
- Gastrointestinal : glossitis, stomatitis, mual, muntah dan diare pseudomembran colitis.
- Sistem hematopoietik dan limfoid : anemia, trombositopenia, eosinofilia, leukopenia dan agnulositosis.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Ampicilin sebaiknya diminum dengan air yang cukup, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.
- Kemungkinan timbul superinfeksi yang disebabkan oleh *Candida*, *Enterobacter*, *Pseudomonas* pada pemakaian jangka lama dan dosis tinggi.
- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena keamanan penggunaannya belum diketahui dengan pasti.
- Penggunaan Ampicilin agar segera dihentikan bila terdapat efek samping.
- Pemeriksaan periodik terhadap fungsi hati, ginjal dan darah agar dilakukan pada penggunaan jangka panjang.

	INTERAKSI OBAT
--	----------------

- Penggunaan bersama dengan Allopurinol, meningkatkan kemungkinan reaksi hipersensitivitas.
- Penggunaan dengan kontrasepsi oral akan menurunkan efektivitas dari kontrasepsi oral.
- Penggunaan dengan Probenecid dapat meningkatkan memperpanjang kadar Ampicillin dalam darah.

	OVERDOSIS
--	-----------

- Pada kasus overdosis, pengobatan agar dihentikan.
- Pada pasien dengan kerusakan ginjal, antibiotik kelas Ampicillin dapat dikurangi dengan cara hemodialisis.

	CARA PENYIMPANAN
--	------------------

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak

	KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI
--	------------------------------

Dus, 10 strip @ 10 kaplet Ampicillin trihydrate 500, No. Reg. : XXXXXXXXXXXXXXX

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Diproduksi oleh :

 mersi

PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia

	0000-0000000-00
--	-----------------

Diproduksi oleh:
 mersi