

ARTWORK DESIGN STANDARD INSERT



PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
DEPARTEMEN DESIGN & PACKAGING

Date of use: 12/06/2025
(DD-MM-YYYY)

MERSIDOL DROPS

Size (L x W) 159 x 99 mm

Material
HVS Paper 60g
Packsize/Primary
Drop 100mg/mL
Primary
Bottle @ 15 mL
No. Reg
MERSIDOL Drop, No. Reg. XXXXXXXXXXXX

Front / Back	
Type Font	
Product Name	Another Font
Insaniburger Regular	Arial Regular / Bold
9.89pt	6pt

16 x 4mm (LxH)	TEXT Black
Material Code	
IIN00352	

**MERSIDOL
PARACETAMOL**
Drops 100 mg/mL

PEMERIAN OBAT
Larutan jernih, berwarna merah, rasa manis sedikit pahit dengan aroma ceri.

KOMPOSISI
Tiap mL mengandung:
Paracetamol 100 mg

ZAT TAMBAHAN
Propylene glycol, Povidone K-30, Glycerin, Macrogol 6000, Saccharin sodium, Sucralose, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Citric acid anhydrate, Cherry flavour, Eurocert carmoisine, Purified water.

CARA KERJA
Paracetamol yang bekerja sebagai analgesik-antipiretik.
- Sebagai analgesik, bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.

INDIKASI
MERSIDOL diindikasikan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam.

KONTRAINDIKASI
- Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.

EFEK SAMPING
- Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Reaksi hipersensitivitas.

PERINGATAN DAN PERHATIAN
- Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak kunjung menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN
Posologi
Di bawah 1 tahun : 0,6 mL, 3-4 kali sehari.
1-2 tahun : 0,6-1,2 mL, 3-4 kali sehari.
Atau menurut petunjuk dokter.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI
Dus, botol @ 15 mL, No. Reg. XXXXXXXXXXXXXXXX

CARA PENYIMPANAN
Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

BAIK DIGUNAKAN SAMPAI DENGAN 30 HARI SETELAH KEMASAN DIBUKA.

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:
Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma
Email : farmakovigilans@mersifarma.com
Telepon : 0818-8287-0825

KOCOK DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN

Diproduksi oleh:

PT. Mersifarma TM
Sukabumi – Indonesia

**MERSIDOL
PARACETAMOL**
Drops 100 mg/mL

DRUG DESCRIPTION
Clear liquid, red color, slightly bitter sweet taste with cherry flavour.

COMPOSITION
Each mL contains:
Paracetamol100 mg

EXCIPIENTS
Propylene glycol, Povidone K-30, Glycerin, Macrogol 6000, Saccharin sodium, Sucralose, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Citric acid anhydrate, Cherry flavour, Eurocert carmoisine, Purified water.

ACTIONS
Paracetamol acts as an analgesic-antipyretic.
- As an analgesic by increasing pain threshold.
- As an antipyretic by direct action on the hypothalamic heat regulating center.

INDICATIONS
MERSIDOL is indicated for the relief of pain, in conditions headache, toothache, and fever.

CONTRAINDICATIONS
- Hypersensitivity to Paracetamol.
- Patients with severe hepatic dysfunctions.

SIDE EFFECTS
- Prolonged use and overdosage may cause liver damage.
- Hypersensitivity reactions.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
- Should be used with caution in patients with renal disease.
- Consult to Health Service Unit if fever persists for more than 2 days or if pain continuous for more than 5 days.
- The use of this drug in patient consuming alcohol may increase the risk of liver damage.

POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION
Posology
Under 1 year : 0,6 mL, 3-4 times daily.
1-2 years : 0,6-1,2 mL, 3-4 times daily.
Or as directed by the physician.
Method of Administration
The drug is given orally.

PRESENTATION AND REGISTRATION NUMBER
Box, bottle @ 15 mL, Reg. No. XXXXXXXXXXXXXXXX

STORAGE
Store at temperature below 30°C, protect from light.
Keep out of the reach of children.

USE WITHIN 30 DAYS AFTER OPENING.

For reporting Side Effects and Product Complaints, please contact:
PT. Mersifarma Pharmacovigilance Team
Email : farmakovigilans@mersifarma.com
Telephone : 0818-8287-0825

SHAKE WELL BEFORE USE

Manufactured by:

PT. Mersifarma TM
Sukabumi – Indonesia
000000-000000-00

IIN00352

159

99

Note:	CHECKED & APPROVED BY				
	R&D		RA		
	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
	Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Bus. Dev

Dir. Bus. Dev

Not at scale - Size in mm

PEMERIAN OBAT
Larutan jernih, berwarna merah, rasa manis sedikit pahit dengan aroma ceri.

Tiap mL mengandung:
Paracetamol 100 mg

Propylene glycol, Povidone K-30, Glycerin, Macrogol 6000, Saccharin sodium, Sucralose, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Citric acid anhydrate, Cherry flavour, Eurocert carmoisine, Purified water.

- Sebagai analgesik, bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.

MERSIDOL diindikasikan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam.

- Hipersensitivitas terhadap Paracetamol.
- Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat.

- Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Reaksi hipersensitivitas.

- Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak kunjung menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.

Posologi
Di bawah 1 tahun : 0,6 mL, 3-4 kali sehari.
1-2 tahun : 0,6-1,2 mL, 3-4 kali sehari.
Atau menurut petunjuk dokter.


Obat diberikan secara oral.

Dus, botol @ 15 mL, No. Reg. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Simpan pada suhu di bawah 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:
Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma
 Email : farmakovigilans@mersifarma.com
 Telepon : 0818-8287-0825

KOCOK DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN



DRUG DESCRIPTION
Clear liquid, red color, slightly bitter sweet taste with cherry flavour.

Each mL contains:
Paracetamol 100 mg

Propylene glycol, Povidone K-30, Glycerin, Macrogol 6000, Saccharin sodium, Sucralose, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Citric acid anhydrate, Cherry flavour, Eurocert carmoisine, Purified water.

- As an analgesic by increasing pain threshold.
- As an antipyretic by direct action on the hypothalamic heat regulating center.

MERSIDOL is indicated for the relief of pain, in conditions headache, toothache, and fever.

- Hypersensitivity to Paracetamol.
- Patients with severe hepatic dysfunctions.

- Prolonged use and overdosage may cause liver damage
- Hypersensitivity reactions.

- Should be used with caution in patients with renal disease.
- Consult to Health Service Unit if fever persists for more than 2 days or if pain continuous for more than 5 days.
- The use of this drug in patient consuming alcohol may increase the risk of liver damage.

Posology
Under 1 year : 0,6 mL, 3-4 times daily.
1-2 years : 0,6-1,2 mL, 3-4 times daily.
Or as directed by the physician.


The drug is given orally.

Box, bottle @ 15 mL, Reg. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Store at temperature below 30°C, protect from light.
Keep out of the reach of children.

For reporting Side Effects and Product Complaints, please contact:
PT. Mersifarma Pharmacovigilance Team
 Email : farmakovigilans@mersifarma.com
 Telephone : 0818-8287-0825

Manufactured by:



11N00352