


PRINTING LIDFOIL



Actual size - Size in mm

STRUCTURE STANDARD LIDFOIL



MERSIDOL	
Size (L x W) 110 x 51 mm	
Material	No. Reg
FOIL PTP 20 U	DBL2133317404A1

Front / Rear Panel			Back / Rear Panel
Type Font			Type Font
Product Name	Active Ingredient	Another Font	Another Font
Insaniburger, Bold	Frutiger, Bold Italic	Myriad, Bold	Myriad, Regular Bold
26pt	20.8pt ~ 12pt	8pt	5pt



Date of use: 04/02/2026
(DD-MM-YYYY)

235

PRINTING
READS
THIS WAY

The diagram shows a curved surface, possibly a book cover or a piece of paper, with the text "PRINTING READS THIS WAY" written vertically. An arrow points to the right, indicating the direction of reading.

Bottom of design leading into machine


500 meter

PRINTING
READS
THIS WAY

235

74 mm

SKETCHES

[illegible][illegible][illegible]

Disseminasi oleh:

@mesji
 PT. Mesjiana JM
 101, Mesjiana, Jember - Indonesia



www.mesji.com

KONTAK DAN INFORMASI:

• Produk dan pelayanan (fungsi) alat yang benar.
 • Produk dan pelayanan sesuai dengan kemampuan alat dan tenaga.
 • Efisiensi pemakaian.

PERINGATAN DAN PERHATIAN:

• Alat ini harus digunakan oleh orang pada penderita penyakit ginjal tidak mengalami gejala-gejala lain yang menunjukkan adanya penyakit ginjal.
 • Penggunaan alat ini pada penderita yang menggunakan alat lain yang menimbulkan gangguan kesehatan.
 • KEMASUKAN DAN NOMOR REGISTRASI:
 1. Baster @ 10 Baster 704411

© 2010 PT. Mesjiana JM

Produk dan pelayanan (fungsi) alat yang benar.

Produk dan pelayanan sesuai dengan kemampuan alat dan tenaga.

Efisiensi pemakaian.

PERINGATAN DAN PERHATIAN:

Alat ini harus digunakan oleh orang pada penderita penyakit ginjal tidak mengalami gejala-gejala lain yang menunjukkan adanya penyakit ginjal.

Penggunaan alat ini pada penderita yang menggunakan alat lain yang menimbulkan gangguan kesehatan.

KEMASUKAN DAN NOMOR REGISTRASI:

1. Baster @ 10 Baster 704411

© 2010 PT. Mesjiana JM

SIMPAN DI BAWAH SUDUT 30°

TELUKUNDUNG DARI CAHAYA

JAUHKAN DARI API

JAUHKAN DARI ANAK-ANAK

Simpan di bawah sudut 30°

Tutupkan dari cahaya

Jauhkan dari api

Jauhkan dari anak-anak

[illegible][illegible]

mersi **mersi** **mersi**

KOMPONEN ORAM:
 Kapsul mengandung beberapa partik, parafin 180 mm x lebar 70 mm, dengan ketebalan 1 mm, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

KOMPONISI:
 Tiga tablet mengandung masing-masing 250 mg amoxicillin, 125 mg clavulanic acid, dan 500 mg metoclopramide.

Parafin 180 mm x lebar 70 mm:
 Parafin 180 mm x lebar 70 mm, dengan ketebalan 1 mm, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Amoxicillin, 250 mg:
 Amoxicillin, 250 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Clavulanic acid, 125 mg:
 Clavulanic acid, 125 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Metoclopramide, 500 mg:
 Metoclopramide, 500 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Polipropilena:
 Polipropilena, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Amoxicillin, 250 mg:
 Amoxicillin, 250 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Clavulanic acid, 125 mg:
 Clavulanic acid, 125 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Metoclopramide, 500 mg:
 Metoclopramide, 500 mg, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.

Polipropilena:
 Polipropilena, yang terbuat dari polipropilena. Kapsul ini memiliki desain khusus yang memastikan bahwa kapsul tidak akan terdorong menjadi dua bagian yang sama besar.



PT. BAWAH SUNDU 30
 TELUNGJUNG DARI CAHAYA,
 JANGKAUAN DARI ANAK.

Disinilah oleh

mesin

PROSES




SIMPAN DI BAWAH SUNDU 30
 TELUNGJUNG DARI CAHAYA,
 JANGKAUAN DARI ANAK.

Actual size - Size in mm

		Material Code	2D Barcode	Design Code
		ILF00105	BPOM RI  6.5 x 6.5 mm	MRD_003.01
13 x 4mm (LxH)	Black			

PRINTING LIDFOIL



Actual size - Size in mm

PENERIAN OBAT:
Kapsul berbentuk bulat, putih, panjang 180 mm x lebar 70 mm dengan penandaan atas dan penandaan bawah berdefinisi.
KOMPOSISI:
Tipe kapsul Meridol mengandung Paracetamol 500 mg
ZAT TAMBAHAN:
Lactose K-30, Com starch, Microcrystalline cellulose 102, Lactose monohydrate, Talc, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, purified water.
CARA KERJA:
Analgesik antipiretik, bekerja dengan meningkatkan ambang nyeri.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.
INDIKASI:
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.
Posologi dan Cara Pemberian
Dewasa: 1-2 kapsul 3-4 kali sehari.
Anak-anak: 6-12 tahun ½-1 kapsul 3-4 kali sehari.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTINDAKSI:
• Perhatian gangguan fungsi hati yang berat.
• Perhatian hipersensitif terhadap obat ini.
• Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
PENINGGATAN DAN PERHATIAN:
• Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
• Bila setelah 7 hari demam tidak membaik atau setelah 5 hari nyeri tidak membaik segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan 1 blister @ 10 kapsul
No Reg DBL/133317/404A.1
Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Prodek, dapat menghubungi:
Email : farmakovigilance@merisirma.com
Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:
PT. Merisirma TM
Sukabumi - Indonesia

SIMPAN DI BAWAH SUHU 30°C
TERLINDUNG DARI CAHAYA
JAUHKAN OBAT DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK.

PENERIAN OBAT:
Kapsul berbentuk bulat, putih, panjang 180 mm x lebar 70 mm dengan penandaan atas dan penandaan bawah berdefinisi.
KOMPOSISI:
Tipe kapsul Meridol mengandung Paracetamol 500 mg
ZAT TAMBAHAN:
Lactose K-30, Com starch, Microcrystalline cellulose 102, Lactose monohydrate, Talc, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, purified water.
CARA KERJA:
Analgesik antipiretik, bekerja dengan meningkatkan ambang nyeri.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.
INDIKASI:
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.
Posologi dan Cara Pemberian
Dewasa: 1-2 kapsul 3-4 kali sehari.
Anak-anak: 6-12 tahun ½-1 kapsul 3-4 kali sehari.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTINDAKSI:
• Perhatian gangguan fungsi hati yang berat.
• Perhatian hipersensitif terhadap obat ini.
• Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
PENINGGATAN DAN PERHATIAN:
• Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
• Bila setelah 7 hari demam tidak membaik atau setelah 5 hari nyeri tidak membaik segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan 1 blister @ 10 kapsul
No Reg DBL/133317/404A.1
Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Prodek, dapat menghubungi:
Email : farmakovigilance@merisirma.com
Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:
PT. Merisirma TM
Sukabumi - Indonesia

SIMPAN DI BAWAH SUHU 30°C
TERLINDUNG DARI CAHAYA
JAUHKAN OBAT DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK.

PENERIAN OBAT:
Kapsul berbentuk bulat, putih, panjang 180 mm x lebar 70 mm dengan penandaan atas dan penandaan bawah berdefinisi.
KOMPOSISI:
Tipe kapsul Meridol mengandung Paracetamol 500 mg
ZAT TAMBAHAN:
Lactose K-30, Com starch, Microcrystalline cellulose 102, Lactose monohydrate, Talc, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, purified water.
CARA KERJA:
Analgesik antipiretik, bekerja dengan meningkatkan ambang nyeri.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.
INDIKASI:
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.
Posologi dan Cara Pemberian
Dewasa: 1-2 kapsul 3-4 kali sehari.
Anak-anak: 6-12 tahun ½-1 kapsul 3-4 kali sehari.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTINDAKSI:
• Perhatian gangguan fungsi hati yang berat.
• Perhatian hipersensitif terhadap obat ini.
• Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
PENINGGATAN DAN PERHATIAN:
• Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
• Bila setelah 7 hari demam tidak membaik atau setelah 5 hari nyeri tidak membaik segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan 1 blister @ 10 kapsul
No Reg DBL/133317/404A.1
Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Prodek, dapat menghubungi:
Email : farmakovigilance@merisirma.com
Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:
PT. Merisirma TM
Sukabumi - Indonesia

SIMPAN DI BAWAH SUHU 30°C
TERLINDUNG DARI CAHAYA
JAUHKAN OBAT DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK.

PENERIAN OBAT:
Kapsul berbentuk bulat, putih, panjang 180 mm x lebar 70 mm dengan penandaan atas dan penandaan bawah berdefinisi.
KOMPOSISI:
Tipe kapsul Meridol mengandung Paracetamol 500 mg
ZAT TAMBAHAN:
Lactose K-30, Com starch, Microcrystalline cellulose 102, Lactose monohydrate, Talc, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, purified water.
CARA KERJA:
Analgesik antipiretik, bekerja dengan meningkatkan ambang nyeri.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.
INDIKASI:
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.
Posologi dan Cara Pemberian
Dewasa: 1-2 kapsul 3-4 kali sehari.
Anak-anak: 6-12 tahun ½-1 kapsul 3-4 kali sehari.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTINDAKSI:
• Perhatian gangguan fungsi hati yang berat.
• Perhatian hipersensitif terhadap obat ini.
• Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
PENINGGATAN DAN PERHATIAN:
• Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
• Bila setelah 7 hari demam tidak membaik atau setelah 5 hari nyeri tidak membaik segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.
• Penggunaan obat ini pada penderita yang menggunakan 1 blister @ 10 kapsul
No Reg DBL/133317/404A.1
Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Prodek, dapat menghubungi:
Email : farmakovigilance@merisirma.com
Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:
PT. Merisirma TM
Sukabumi - Indonesia

SIMPAN DI BAWAH SUHU 30°C
TERLINDUNG DARI CAHAYA
JAUHKAN OBAT DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK.

DISETUJUI OLEH BPOM : 09/02/2026



Actual size - Size in mm