

ARTWORK DESIGN STANDARD INSERT (CARTONING MACHINE)

Date of use: 18/11/2025
(DD-MM-YYYY)

Metamizole Sodium

Size (L x W) 159 x 99 mm

Material
HVS Paper 70g
Packsizes/Primary
10 blister @ 10 tablet
No. Reg
Dus, 10 blister @ 10 tablet Metamizole Sodium, No. Reg. GKL0033303210A1

Front / Back	
Type Font	
Product Name	Another Font
Myriad Pro, Bold	Arial Regular / Bold
9pt	6pt

	
16 x 4mm (LxH)	TEXT Black
Material Code	
IIN00007	

Note:

CHECKED & APPROVED BY				
R&D		RA		
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Prod. Dev

Metamizole Sodium
Tablet 500 mg

PEMERIAN OBAT
Tablet bulat pipih warna putih, diameter 13 mm penandaan atas mif, penandaan bawah *breakline*.
Garis bagi hanya untuk memfasilitasi kemudahan pasien dalam menelan obat, tidak untuk pembagian dosis.

KOMPOSISI
Tiap tablet mengandung:
Metamizole Sodium 500 mg

ZAT TAMBAHAN
Talc, Magnesium stearate, Sodium starch glycolate, Sodium lauryl sulfate, Povidone K-30, Corn starch, Purified water, Microcrystalline cellulose (pH 102).

CARA KERJA
Metamizole sodium bekerja sebagai analgesik. Diabsorpsi dari saluran pencernaan, mempunyai waktu paruh 1-4 jam.

INDIKASI
Untuk meringankan rasa sakit, terutama nyeri kolik dan sakit setelah operasi.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN
Posologi
Dewasa: jika sakit 1 tablet, berikutnya 1 tablet setiap 6-8 jam, maksimum 4 tablet sehari.
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTRAINDIKASI
- Penderita hipersensitif.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Penderita dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg.

PERINGATAN DAN PERHATIAN
- Tidak untuk mengobati sakit otot pada gejala-gejala flu, rematik, lumbago, sakit punggung, bursitis, sindroma bahu-lengan.
- Karena dapat menimbulkan agranulositosis yang berakibat fatal, maka sebaiknya tidak digunakan dalam jangka panjang terus-menerus.
- Pada pemakaian jangka lama dapat timbul sindrom neuropati yang akan berangsur hilang bila pengobatan dihentikan.
- Hati-hati pada penderita yang pernah mengalami gangguan pembentukan darah/kelainan darah, gangguan fungsi hati atau ginjal. Perlu dilakukan pemeriksaan uji fungsi hati dan darah pada penggunaan yang lebih lama dari penggunaan untuk mengatasi rasa sakit akut.

EFEK SAMPING
- Reaksi hipersensitivitas: reaksi pada kulit, misalnya kemerahan.
- Agranulositosis.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI
Dus, 10 blister @ 10 tablet Metamizole Sodium, No. Reg. GKL0033303210A1

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:
Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma
Email : farmakovigilans@mersifarma.com
Telepon : 0818-8287-0825

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Diproduksi oleh:

PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia
0000-000000-00

IIN00007

Actual size - Scale 100 %

STANDARD SECONDARY 2025