

ARTWORK DESIGN STANDARD LIDFOIL




PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
DEPARTEMEN DESIGN & PACKAGING

Date of use: 15/05/2026
(DD-MM-YYYY)

ANTASIDA DOEN			
Size (L x W) 500 meter x 205 mm			
Material	Packsize/Primary	No. Reg	No. Sertifikat Halal
FOIL PTP 20 U	10 blisters @ 10 chewable tablets	GBL1733313963A1	ID32410057153480426

Front / Rear Panel		
Type Font		
Product Name	Active Ingredient	Another Font
Myriad, Bold	Myriad, Bold	Arial Narrow Bold Regular
12pt	10pt	4.5pt



					Material Code	Design Code
12 x 3mm (LxH)	Black	GREEN TC 4115	Ø7mm	Ø7mm	ILF00005	ADN_040.06

CHECKED & APPROVED BY				
R&D		RA		
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Prod. Dev

Dried Aluminium Hydroxide Gel setara dengan	
Al (OH) ₃	200 mg
Magnesium Hydroxide	200 mg

Mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari, dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati.

POSOLOGI / DOSIS
Dewasa: 1–2 tablet kunyah, sehari 3–4 kali.
Anak 6–12 tahun: ½–1 tablet kunyah, sehari 3–4 kali.
Diminum 1–2 jam setelah makan dan menjelang tidur,
sebaiknya tablet dikunyah dulu.

Antasida Doen **Antasida D**

EFEK SAMPING
Pada pasien yang hipersensitif dapat terjadi reaksi alergi seperti urtikaria, ruam kulit, pruritis, angioedema dan gangguan saluran cerna seperti diare, mual, muntah, glositis dan stomatitis.

PERINGATAN DAN PERHATIAN
Tidak dianjurkan penggunaan terus-menerus lebih dari 2 minggu dan anak-anak dibawah umur 6 tahun. Penggunaan bersama Cimetidine atau Tetracycline harap diberikan dengan selang waktu 1-2 jam, hati-hati pemberian pada penderita di fosfor rendah dan pemakaian lama karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah.

INTERAKSI OBAT
Pemberian bersama-sama dengan Cimetidine atau Tetracycline dapat mengurangi absorpsi obat tersebut.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di bawah suhu 30°C,
terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
No. Reg. GBL1733313963A1
000000-000000-00


HALAL
INDONESIA
BUREAU CERTIFICATION

Diproduksi oleh:
 **mersi**
PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia
ILF00005 - ADN, 040.06



Dried Aluminium Hydroxide Gel setara dengan	
Al (OH) ₃	200 mg
Magnesium Hydroxide	200 mg

Mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari, dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati.

POSOLOGI / DOSIS
Dewasa: 1-2 tablet kunyah, sehari 3-4 kali.
Anak 6-12 tahun: ½-1 tablet kunyah, sehari 3-4 kali.
Diminum 1-2 jam setelah makan dan menjelang tidur,
sebaiknya tablet dikunyah dulu.

Antasida Doen Antasida D

EFEK SAMPING
Pada pasien yang hipersensitif dapat terjadi reaksi alergi seperti urtikaria, ruam kulit, pruritis, angioedema dan gangguan saluran cerna seperti diare, mual, muntah, glositis dan stomatitis.

PERINGATAN DAN PERHATIAN
Tidak dianjurkan penggunaan terus-menerus lebih dari 2 minggu dan anak-anak dibawah umur 6 tahun. Penggunaan bersama Cimetidine atau Tetracycline harap diberikan dengan selang waktu 1-2 jam, hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah.

INTERAKSI OBAT
Pemberian bersama-sama dengan Cimetidine atau Tetracycline dapat mengurangi absorpsi obat tersebut.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di bawah suhu 30°C,
terlindung dari cahaya.
Jaukan obat dari jangkauan anak-anak.

No. Reg. GBL1733313963A1
000000-000000-00

**Diproduksi oleh:**
mersi
PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia
ILF00005 - ADN, 040.06

**HALAL**
INDONESIA
BESERTA SERTIFIKAT HALAL



Antasida Doen Antasida Doen Antasida Doen Antasida Doen

- 100