

ARTWORK DESIGN STANDARD ETIKET TOLL




PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
DEPARTEMEN DESIGN & PACKAGING

Date of use: 20/04/2026
(DD-MM-YYYY)


ANTASIDA DOEN SUSPENSII (TOLL PAKIS)			
Size (L x W) 120 x 43 mm			
Material	Packsizes/Primary	Primary	No. Reg
Sticker High Gloss Paper S1010 BG 40 WH	200 mg / 5 mL	Plastic Bottle Syrup 60mL	GBL1733314033A1

Front / Rear Panel			Left / Right Side Panel
Type Font			Type Font
Product Name	Dosage Form	Another Font	Another Font
Myriad Pro, Bold	Myriad Pro, Bold	Cooper Std, Bold	Arial, Bold / Regular
17pt	12pt	10pt	4.5pt


ROLL PRINTED ETIKET
GAP ~ DIE CUT



SKETCHES



Preview Gap Roll



Actual size– Scale 100 %

				Material Code	Design Code	2D Barcode	Finishing
Ø 9mm	Ø 9mm	12 x 3mm (LxH)	GREEN TC 4115	BLACK	IET00288	ET_ATD_178.00	10 x 10 mm Full Varnish waterbase

CHECKED & APPROVED BY				
R&D		RA		
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Prod. Dev

Posologi dan Cara Pemberian:
Posologi:
 Dewasa : 1–2 sendok takar (5–10 mL)
 3–4 kali sehari.
 Anak-anak 6–12 tahun: $\frac{1}{2}$ –1 sendok takar
 (2,5–5 mL) 3–4 kali sehari.
Cara Pemberian
 Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam
 setelah makan dan menjelang tidur.
 Simpan di bawah suhu 30°C,
 terlindung dari cahaya.
 Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.



Antasida Doen
 Aluminium Hydroxide 200 mg/5 mL
 Magnesium Hydroxide 200 mg/5 mL
Suspensi

Perhatian: Setelah kemasan dibuka,
 suspensi tidak boleh disimpan lebih
 dari 14 hari.

Indikasi:
 Untuk mengurangi gejala-gejala yang
 berhubungan dengan kelebihan asam lambung,
 gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari,
 dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati,
 kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

SPOM RI
 No. Reg. : GBL1733314033A1
 Batch No. :
 MD / ED :
 HET :


Botol plastik @ 60 mL

Untuk:
 **Mersifarm**
 PT. Mersifarma TM
 Sukabumi - Indonesia

Untuk:
 **Paks Farma Raya**
 Klaten - Indonesia

Indikasi:
 Untuk mengurangi gejala-gejala yang
 berhubungan dengan kelebihan asam lambung,
 gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari,
 dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati,
 kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

Indikasi:
 Untuk mengurangi gejala-gejala yang
 berhubungan dengan kelebihan asam lambung,
 gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari,
 dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati,
 kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

Indikasi:
 Untuk mengurangi gejala-gejala yang
 berhubungan dengan kelebihan asam lambung,
 gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari,
 dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati,
 kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

Indikasi:
 Untuk mengurangi gejala-gejala yang
 berhubungan dengan kelebihan asam lambung,
 gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari,
 dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati,
 kembung, dan perasaan penuh pada lambung.