

ARTWORK DESIGN STANDARD INSERT

ANTASIDA DOEN SUSPensi (TOLL PAKIS)

Size (L x W) 170 x 100 mm

Material
HVS Paper 60g
Packsize/Primary
Bottle 60 mL
No. Reg
GBL1733314033A1

Front / Back	
Type Font	
Product Name	Another Font
Myriad Pro, Bold	Arial Regular / Bold
10pt	6pt

	
16 x 4mm (LxH)	TEXT Black
Material Code	Design Code
IIN00429	IN_ATDP_307.00

CHECKED & APPROVED BY				
R&D		RA		
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Prod. Dev



PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
DEPARTEMEN DESIGN & PACKAGING

Date of use: 20/04/2026

(DD-MM-YYYY)

100

170

Antasida Doen

Suspensi

PEMERIAN OBAT

Cairan suspensi kental, warna putih dan wangi peppermint.

KOMPOSISI

Tiap 5 mL suspensi Antasida Doen mengandung:
Dried Aluminium Hydroxide Gel setara dengan Al (OH)₃ 200 mg
Magnesium Hydroxide 200 mg

ZAT TAMBAHAN

Sodium carboxymethyl cellulose, Sorbitol, sucralose, Peppermint oil, Mannitol, Purified water, Methylparaben, Propylparaben, Propylene glycol, Citric acid, Disodium edetate dihydrate, Hydrochloric acid.

CARA KERJA

Kombinasi Aluminium hydroxide dan Magnesium hydroxide merupakan antasida yang bekerja menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin, sehingga rasa nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Disamping itu, efek laksatif dari Magnesium hydroxide akan mengurangi efek konstipasi dari Aluminium hydroxide.

INDIKASI

Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari, dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN

Posologi

Dewasa: 1–2 sendok takar (5–10 mL) 3–4 kali sehari.
Anak-anak 6–12 tahun: ½–1 sendok takar (2,5–5 mL) 3–4 kali sehari.

Cara Pemberian

Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur.

KONTRAINDIKASI

Jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat, karena dapat menimbulkan hipermagnesia (kadar magnesium dalam darah meningkat).

EFEK SAMPING

Efek samping yang umum adalah sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Tidak dianjurkan digunakan terus menerus lebih dari 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter.
- Bila sedang menggunakan obat tukak lambung lain seperti Cimetidine atau antibiotik Tetracycline, harap diberikan dengan selang waktu 1–2 jam.
- Tidak dianjurkan pemberian pada anak-anak di bawah 6 tahun, kecuali atas petunjuk dokter, karena biasanya kurang jelas penyebab gangguan penyakitnya.
- Hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah.

INTERAKSI OBAT

Pemberian bersama-sama dengan Cimetidine atau antibiotik Tetracycline dapat mengurangi absorpsi obat tersebut.

CARAPENYIMPANAN

Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
Perhatian: Setelah kemasan dibuka, suspensi tidak boleh disimpan lebih dari 14 hari.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI

Botol plastik @ 60 mL suspensi Antasida Doen, No. Reg. GBL1733314033A1

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:

Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma

Email : farmakovigilans@mersifarma.com

Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:

 **Pakis Farma Raya**
Klaten - Indonesia
0000-0000000-00

Untuk:

 **Mersi**
PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia

IIN00429-IN_ATDP_307.00

Actual size - Size in mm

STANDARD SECONDARY 2026

100

170

Antasida Doen

Suspensi

PEMERIAN OBAT

Cairan suspensi kental, warna putih dan wangi peppermint.

KOMPOSISI

Tiap 5 mL suspensi Antasida Doen mengandung:
Dried Aluminium Hydroxide Gel setara dengan Al (OH)₃ 200 mg
Magnesium Hydroxide 200 mg

ZAT TAMBAHAN

Sodium carboxymethyl cellulose, Sorbitol, sucralose, Peppermint oil, Mannitol, Purified water, Methylparaben, Propylparaben, Propylene glycol, Citric acid, Disodium edetate dihydrate, Hydrochloric acid.

CARA KERJA

Kombinasi Aluminium hydroxide dan Magnesium hydroxide merupakan antasida yang bekerja menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin, sehingga rasa nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Disamping itu, efek laksatif dari Magnesium hydroxide akan mengurangi efek konstipasi dari Aluminium hydroxide.

INDIKASI

Untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus dua belas jari, dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN

Posologi

Dewasa: 1–2 sendok takar (5–10 mL) 3–4 kali sehari.
Anak-anak 6–12 tahun: ½–1 sendok takar (2,5–5 mL) 3–4 kali sehari.

Cara Pemberian

Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur.

KONTRAINDIKASI

Jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat, karena dapat menimbulkan hipermagnesia (kadar magnesium dalam darah meningkat).

EFEK SAMPING

Efek samping yang umum adalah sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Tidak dianjurkan digunakan terus menerus lebih dari 2 minggu, kecuali atas petunjuk dokter.
- Bila sedang menggunakan obat tukak lambung lain seperti Cimetidine atau antibiotik Tetracycline, harap diberikan dengan selang waktu 1–2 jam.
- Tidak dianjurkan pemberian pada anak-anak di bawah 6 tahun, kecuali atas petunjuk dokter, karena biasanya kurang jelas penyebab gangguan penyakitnya.
- Hati-hati pemberian pada penderita diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah.

INTERAKSI OBAT

Pemberian bersama-sama dengan Cimetidine atau antibiotik Tetracycline dapat mengurangi absorpsi obat tersebut.

CARAPENYIMPANAN

Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
Perhatian: Setelah kemasan dibuka, suspensi tidak boleh disimpan lebih dari 14 hari.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI

Botol plastik @ 60 mL suspensi Antasida Doen, No. Reg. GBL1733314033A1

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:

Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma

Email : farmakovigilans@mersifarma.com

Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:

Pakis Farma Raya

Klaten - Indonesia
0000-000000-00

Untuk:

mersi

PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia

IIN00429-IN_ATDP_307.00